

TETRALYSAL<sup>®</sup>  
limeciclina

CÁPSULAS

150 mg e 300 mg



## **TETRALYSAL® 150 & 300** **limeciclina**

### **APRESENTAÇÕES:**

TETRALYSAL® 150 cápsulas: embalagens com 16 unidades.

TETRALYSAL® 300 cápsulas: embalagens com 8, 16 e 28 unidades.

### **USO ORAL**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 8 ANOS DE IDADE**

### **COMPOSIÇÃO**

#### **TETRALYSAL® 150**

limeciclina (expressa como tetraciclina base) ..... 150mg \*

Excipiente (lactose, amido, dióxido de silício, estearato de magnésio).....qsp..... 1 cápsula

\* 150mg de tetraciclina equivalem a 226mg de limeciclina.

Composição da cápsula nº 1 (utilizada para TETRALYSAL® 150): gelatina, dióxido de titânio E171, eritrosina E127, amarelo quinolina E104.

#### **TETRALYSAL® 300**

limeciclina (expressa como tetraciclina base)..... 300mg\*\*

Excipiente (dióxido de silício, estearato de magnésio) .....qsp..... 1 cápsula

\*\* 300mg de tetraciclina equivalem a 452 mg de limeciclina.

Composição da cápsula nº zero (utilizada para TETRALYSAL® 300): gelatina, dióxido de titânio E171, dióxido de enxofre, eritrosina E127, amarelo quinolina E104 e indigotina E132.

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

TETRALYSAL® é indicado para o tratamento de infecções sensíveis às tetraciclinas. Na dermatologia, o produto é indicado para o tratamento da acne vulgar e da rosácea, associado ou não ao tratamento tópico específico.

#### **2. COMO ESSE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

TETRALYSAL® é um antibiótico eficaz contra micro-organismos sensíveis. Os sinais e sintomas da infecção devem melhorar progressivamente, com o decorrer do tratamento.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

TETRALYSAL® não deve ser utilizado se você for alérgico às tetraciclinas.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 8 anos de idade.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

Não use durante o período de amamentação.

Não usar conjuntamente com retinoides orais.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Informe ao médico se você tiver doenças no fígado ou rins.

Evite a exposição solar excessiva e interrompa o uso do produto se você apresentar vermelhidão na pele.

Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis. Informe ao médico se você estiver fazendo uso de algum outro medicamento.

A limeciclina pode provocar resultados falso-positivos de glicose na urina.

Se você estiver tomando medicamentos à base de ferro ou antiácidos, recomenda-se um intervalo mínimo de duas horas entre a tomada destes medicamentos e a limeciclina.

**Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

O produto deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido do calor e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

TETRALYSAL® 150 é uma cápsula de cores laranja e amarela. TETRALYSAL® 300 é uma cápsula de cores vermelha e amarela.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

A cápsula deve ser tomada com um copo de água, ou outro líquido.

A dose e duração do tratamento devem ser estabelecidas pelo médico.

Tratamento da acne e da rosácea, a dose usual é de 300 mg por dia ou 150 mg pela manhã e 150 mg à noite, durante 12 semanas.

A critério médico, pode-se iniciar o tratamento com 300 mg por dia durante 10 a 15 dias e então reduzir a dose para 150 mg por dia, ou 300 mg em dias alternados.

Outras infecções: a posologia habitual é de 600 mg por dia.

**Pacientes idosos:** uso sob acompanhamento médico, não sendo necessário alterar a posologia.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você se esqueça de tomar o medicamento, tome assim que você se lembrar. No dia seguinte, volte ao esquema normal de tratamento.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

Os efeitos mais comuns ( $\geq 1/100$  a  $\leq 1/10$ ) são cefaleia e distúrbios gastrintestinais, tais como náusea, dor abdominal e diarreia.

Outros efeitos que podem ocorrer (mas não se conhece qual a frequência): neutropenia, trombocitopenia; distúrbios visuais; glossite, enterocolite, vômito, epigastralgia; pirexia; icterícia; hipersensibilidade, urticária, edema angioneurótico, reação anafilática; aumento das transaminases, fosfatase alcalina e bilirrubina; vertigem, hipertensão intracraniana; rash eritematoso, reações de fotossensibilidade, prurido e síndrome de Stevens Johnson.

Alguns eventos adversos relatados com a terapia por tetraciclina em geral: alteração na coloração dos dentes permanentes e/ou hipoplasia do esmalte se o produto for administrado a crianças menores de 8 anos de idade; anemia hemolítica, eosinofilia e outros distúrbios hematológicos; hiperazotemia extrarrenal, ligada a um efeito antianabólico que pode ser intensificado pela associação com diuréticos.

O tratamento deve ser cessado se houver qualquer evidência de pressão intracraniana elevada. Esta pode apresentar-se com sintomas de cefaléia e alteração visual.

**Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Não há tratamento específico recomendado. O médico deverá avaliar a necessidade ou não de esvaziamento gástrico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 600, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS-1.2916.0022

Farm. Resp.: Dra. Maria Del Carmen A.S. Alberti - CRF-SP nº 14.759

Atendimento ao Consumidor ☎ 0800-0155552

sac@galderma.com

**Fabricado por:**

LABORATOIRES SOPHARTEX  
21, Rue du Pressoir  
28500 Vernouillet - França

**Importado por:**

GALDERMA BRASIL LTDA.  
Rodovia SP-101, km 9 - Condomínio Tech Town  
13186-904 - Hortolândia – SP  
CNPJ 00.317.372/0004-99

Venda sob prescrição médica.

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 26/12/2012.**

Rev13

